


One Minute Wonder



... der in der Palliativmedizin verordneten Medikamente sind außerhalb der Zulassung eingesetzt.



Off-Label-Use Medikamente



Off-Label-Use Verabreichungsform: Folgende Medikamente sind offiziell nicht für s.c. Gaben zugelassen, werden aber im palliativen Bereich so verabreicht: Dexamethason, Metoclopramid, Midazolam, Levomepromazin und Metamizol.


Off-Label-Use Indikation:

Haloperidol (z.B. Haldol[®], Haloper[®]) und **Levomepromazin** (z.B. Neurocil[®]) Diese Mittel werden sonst in höherer Dosierung bei psychiatrischen Erkrankungen eingesetzt. Sie sind aber auch in niedrigerer Dosis außerordentlich wirksam gegen Übelkeit und Erbrechen.



Pregabalin (z.B. Lyrica[®]) und **Gabapentin** (z.B. Neurontin[®]) Die Mittel werden normalerweise Patienten mit Epilepsie gegeben. **Amitriptylin** (z.B. Saroten[®]) In höheren Dosierungen werden diese Mittel verordnet, wenn der Patient unter Depressionen leidet. Alle genannten Mittel helfen (bei Amitriptylin in niedrigen Dosierungen) gut, Nervenschmerzen zu lindern.

Morphin Tabletten, Ampullen oder Tropfen und **Fentanyl** Schmelztabletten (z.B. Abstral[®]) oder Nasenspray (z.B. Instanyl[®]). Mit Morphinen werden normalerweise starke Schmerzen behandelt, aber sie lindern Luftnot ebenfalls ganz hervorragend. Auch **Lorazepam** (z.B. Tavor[®]) hilft gut gegen Atemnot, es wird normalerweise zur Behandlung von Angst eingesetzt



Dexamethason (z.B. Dexam[®]) Tabletten und Ampullen. Dexamethason ist ein Cortison-Präparat, das üblicherweise bei der Behandlung von Entzündungen oder allergischen Erkrankungen eingesetzt wird. Es kann Übelkeit und Erbrechen vermindern, bestimmte Schmerzen lindern, Hirndruck senken, den Appetit verbessern und auch das allgemeine Wohlbefinden.

Butylscopolamin (z.B. Buscopan[®]) Ampullen. Butylscopolamin wird eigentlich bei Schmerzen im Magen-Darm-Trakt verwendet, denn es wirkt krampflösend. Es hat aber auch eine Antisekretorische „Nebenwirkung“, weswegen es zum Beispiel beim Terminalen Rasseln eingesetzt wird.



Quellen:

Freie wissenschaftliche Arbeit zur Erlangung des akademischen Grades
„Master of Science (M.Sc.)“ Off-Label-Use subkutan in stationären Hospizen Deutschlands –
Carolin Schmidt; 28.02.2020

Eigenes Fachwissen

Icons erstellt von www.flaticon.com